

# 企業反毒 贏財富



主辦單位：衛生福利部食品藥物管理署

承辦單位：臺灣健康促進學校協會

計畫主持人：紀雪雲教授

日期：109年3月10日修訂



# 工廠自主管理 查獲泰勞集體吸毒

04:10 2017/06/23 | 中國時報 | 鐘武達、彰化



資料來源  
中國時報  
2017/06/23

彰化縣田中警方在社頭鄉查獲全縣首宗由工廠自主管理揭露的外籍勞工集體吸毒案。(鐘武達翻攝)

# 熬過戒毒的日子 勞動署助他成主廚傳承愛

2019-05-09 13:23 聯合報 / 記者鄭國樑 / 即時報導



呂芳銘擅長的西式料理，手工綿綿餅也是他的代表作。署提供

資料來源

聯合報

2019/05/09



勞動部長許銘春（右）讚許呂芳銘（左）好廚藝，肯定他重返職場找回人生價值。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供

# 企業反毒四行動



行動一 **C**are 愛己

行動二 **A**void 退避

行動三 **S**top 拒絕

行動四 **H**elp 助人

# 行動一 Care 愛己

- 建立正確工作態度  
與敬業精神

資料來源  
遠見雜誌  
2018企業最愛大學生調查

表5 企圖心與適應力，是企業最看重社會新鮮人的特質

問：你雇用大學學歷社會新鮮人時，最重視的特質為何？  
(複選，%)



# 行動一 Care 愛己



## • 建立正確工作態度與敬業精神

### 1. 樂於接受工作挑戰

### 與表達想法

真正的勇敢，是看到自己擁有什麼，不是失去什麼！

# 鋼鐵人 醫生



他一開始是一名，白人醫學研究家，  
為了父母是白人教師的未婚妻，  
三歲一場意外，下半身從此失去感覺，  
這一切才開始演變。

「這每天都是如此，  
如何能保持健康的表面，  
不放棄我自己。」

「這就像百上十年和時間……  
提早定好十年後的人生！」

資料來源  
商業週刊  
1349期封面



# 行動一 Care 愛己



- 建立正確工作態度與敬業精神
- ## 2. 面對壓力，尋求合作與協助

全民愛健康 心理篇6

### 你的壓力很大嗎？

圖文制作：健談 havemary.com  
專家諮詢：長庚醫院 專任臨床心理師 吳家琪

1 常頭痛、腰痠背痛	2 又忘了 老是忘東忘西的	3 總覺得工作做不完	4 最近胃口不好或特好
5 老是失眠、睡不好	6 常感到焦慮、煩躁	7 經常與人意見不和	8 注意力難以集中
9 氣色不太好	10 近半年生病不只一次	11 對未來充滿不確定感	12 常覺得很累 假日都在補眠

若符合6項以上症狀，表示你的工作壓力頗大，建議尋求醫師或心理師協助唷！

壓力排解相關問題，建議諮詢「精神科、身心科」

更多資訊請上 健談 havemary.com

# 行動一 Care 愛己



- 建立規律生活作息與時間管理

## 1. 建立健康與規律的生活作息

上網時數越高越憂鬱！董氏調查：逾3成青少年經常感到有壓力

新頭殼newtalk | 蔡廷國 綜合報導

發布 2019.12.04 | 19:02



資料來源  
新頭殼newtalk  
2019/12/04



# 行動一 Care 愛己



## • 建立規律生活作息與時間管理

全民愛健康 睡眠篇24

### 如何避免作息失調?

圖文創作：健談 havemary.com  
專家諮詢：台灣心理健康發展協會理事長暨  
長庚醫院專任臨床心理師 吳家穎

掌握 S-T-A-B-L-E 六口訣建立規律作息，就能讓失眠遠離你喔！

- 1 Snooze**  
建議賴床時間少於 1.5 小時
- 2 Time-in-bed**  
建議躺床時間循規律模式
- 3 Awake**  
建議睡前 8 小時保持清醒
- 4 Breathing training**  
建議睡前 15 分鐘進行腹式呼吸
- 5 Light of sun when wake up**  
建議早上照光 15 分鐘
- 6 Exercise per day**  
建議每天運動 30 分鐘

失眠相關問題，建議諮詢「身心科、精神科、睡眠中心」

更多資訊請上 健談 havemary.com

# 行動一 Care 愛己



- 建立規律生活作息與時間管理
- 2. 採取健康的休閒與抒壓方式



# 行動一 Care 愛己



- 培養良好人際關係

## 1. 喜怒哀樂有同儕分享、支持與分擔



# 行動一 Care 愛己



- 培養良好人際關係

## 2. 選擇正當社交活動及場所



資料來源  
中央社  
2017/11/29

為防範青少年毒品濫用，桃園市立新醫院反毒教育資源中心推出「藥·不要玩」遊戲遊戲，除校園外，立新醫院也和企業結盟，針對高層高層高層高層，早晚輪班，以及高層隨的行樂族群，進行現場反毒教育推廣，中央社記者黃香蘭桃園攝。106年11月29日

# 行動二 **Avoid** 退避



- 遠離是非場所

出入人員混雜的特定場所，如網咖、Pub、夜店、陌生派對等，慎防助興、放鬆的物質



資料來源  
Ettoday新聞雲  
2019/12/24

▲毒趴釀成1死2傷，事後僅陳女意識較為清楚。(圖/東森新聞)

# 行動二 **A**void 退避



## • 遠離是非場所

# 要玩 不藥丸

五光十色的狂歡夜晚，容易暗藏玄機，  
時刻警戒，保護自己，要嗨不要害！

當你感覺到...

- ① 頭暈、噁心或嘔吐
- ② 視力模糊或影像扭曲
- ③ 全身癱瘓或無力
- ④ 無法控制的過度活動
- ⑤ 莫名焦慮
- ⑥ 妄想、幻覺

你可以這樣處理...



# 行動二 **Avoid** 退避



- **遠離毒品誘惑**

**毒品名稱、外貌日新月異，不為其名稱、樣式、色彩迷惑。**

濫用物質變裝後外觀  
「毒郵票」、「毒果凍」



圖片來源  
內政部警政署  
刑事警察局

內政部警政署刑事警察局提供

# 行動二 **Avoid** 退避



- **遠離毒品誘惑**

**毒品不只傷己、禍及胎兒發育，更連累家人、社會、國家。(檢舉藥頭專線110)**

吸毒慘害毀容鼻塌 劉喬安直播「對不起家人」



資料來源  
中時電子報  
2019/04/12



# 藥物濫用危害人體圖鑑

## 呼吸系統

- **大麻**：肺部感染、咳嗽多痰、呼吸道疾病。

## 神經系統


- **鴉片類(嗎啡、海洛因等)**：呼吸抑制、強烈生理及心理成癮性。
- **鎮靜安眠類(苯二氮平類、Z類藥)**：精神恍惚、健忘、注意力不集中。
- **安非他命類(安非他命、MDMA)**：妄想、幻覺、精神疾病、體溫過高甚至致死。
- **大麻、類大麻活性物質(K2)**：幻覺、記憶、學習及認知能力受損。
- **一氧化二氮(笑氣)**：精神異常、錯亂。
- **愾他命**：專注力、學習及記憶力受損、幻覺。
- **合成卡西酮(浴鹽)**：妄想、幻覺、攻擊性、暴力行為、自殘。

## 血液循環系統

- **安非他命類(安非他命、MDMA)、合成卡西酮(浴鹽)**：心悸、心律不整、血壓增高。
- **一氧化二氮(笑氣)**：貧血。
- **愾他命**：心搏過速、血壓上升。
- **靜脈注射毒品**：造成愛滋病、肝炎等血液傳染疾病。

## 泌尿系統

- **愾他命**：膀胱功能受損、尿少、下腹部疼痛、腎功能不全。



# 行動二 **Avoid** 退避



- 避免使用成癮性物質

菸、電子煙、酒、檳榔及大麻等毒品均會影響健康，不可用來減肥、提神、排遣無聊或抒解壓力。



圖片來源  
三立新聞  
2019/08/21

# 行動二 **Avoid** 退避



- 避免使用成癮性物質

18歲少年使用電子菸、肺部如老人



資料來源  
胸腔重症蘇一峰醫師  
2019/09/07部落格

美國一名18歲少年亞當(Adam Hergenreder)，抽食電子菸一年多後出現肺部損害如同70歲老人一般。亞當住院與死神拔河時，選擇站出來以自身例子來警告還在使用電子菸的所有人！

# 行動二 **Avoid** 退避



## • 避免使用成癮性物質

		
	傳統香菸	電子菸
原理	燃燒菸草	霧化香精
成分物質	菸草、助燃劑與添加劑	丙二醇、甘油、香精和尼古丁
煙霧物質	焦油、尼古丁、甲醛等等 7千種以上化學物質	霧化尼古丁與甘油、丙二醇等等
缺點	高度致癌造成多種癌症，並能導致呼吸道與心血管疾病等等問題	煙霧量更多、成癮性可能更高，發現使用電子菸引起嚴重肺炎與多種呼吸道疾病 已有因電子菸死亡個案的出現
重大影響	造成許多死亡、醫療支出	在青少年族群快速成長、不明肺炎在年輕族群產生蔓延

資料來源  
胸腔重症蘇一峰醫師  
2019/09/07部落格

# 行動三 Stop 拒絕



## • 拒絕用毒

### 95%知道吸毒有害 仍因好奇淪陷


——青少年藥物濫用大調查

#### Q1 三大取得毒品地點 (K他命)




註：警方表示，路邊是青少年被檢獲毒品最多的地點，但實際上較常吸食場所，仍是朋友住處或電玩店、遊樂場。

#### Q2 毒品來源 (K他命)



#### Q3 吸食原因 (複選)




#### Q4 首次吸食與成癮年齡

平均 **12.5** 歲初次吸食毒品


平均 **17.3** 歲毒品成癮

資料來源：衛福部《國民健康訪問暨藥物濫用調查》(2009年)、  
《全國物質使用調查結果》(2014年)

#### Q5 藥物濫用傷害認知



#### Q6 藥物濫用成癮認知



# 行動三 Stop 拒絕



## • 拒絕用毒

1. 朋友、同事贈送或要求使用毒品，要有拒絕的勇氣及能力。

當感受到同儕的壓力而要求一起吸食毒品時，  
可用下列方法拒絕誘惑

### 1. 直接拒絕

不用了啦!這東西實在  
太不適合我了!



### 2. 遠離現場

哎呀~我剛買了電影票  
就快開映始演了!!Bye啦



### 3. 轉移話題

我最近發現一個新的遊玩更有趣耶!  
還是回家打Game比較好玩啦~!



### 4. 自我解嘲

還有什麼東西比  
被我媽媽打一頓更  
毒的~!?我看我還是  
別碰這個爛攤吧!!



### 5. 友誼勸服

朋友啊~  
吸毒只會讓你  
後悔莫及而已!  
歹路不通行啊~!  
快扔了它吧!



圖片來源  
100年度藥物濫用手冊  
爸媽管很大

# 行動三 Stop 拒絕



## • 拒絕用毒

2. 面對來路不明的食品、物品、包裹應提高警覺。

來路不明糖果別碰！ 警公布常見及新興毒品照

小熊軟糖:常以夾鏈袋方式散裝	二級毒品:毒梅粉、梅餅(俗稱金剛)	毒咖啡包樣式(一):市售品牌包裝袋	毒咖啡包樣式(二):以單調圖案,且未物標示任何成分之包裝袋偽裝
			
			傻眼

圖片來源  
Ettoday  
2017/11/08

# 行動三 Stop 拒絕



- 拒絕用毒

2. 面對來路不明的食品、物品、包裹應提高警覺。

幫領包裹可拿20萬 打開居然有2公斤K他命



資料來源  
自由時報  
2019/10/08

基隆地檢署近日偵結，依運輸第三級毒品罪將林姓少年起訴。(記者吳昇儒攝)



# 行動三 Stop 拒絕



## • 拒絕托運

**不幫人托運或攜帶可疑物品出入境。**

免費遊泰國3天 包吃包住包玩還爽賺2萬 女回台下場超慘



資料來源  
三立新聞網  
2019/04/23

▲警方在朱女行李的夾層中找到毒品K他命。(圖 / 翻攝畫面)

# 行動三 Stop 拒絕



## • 拒絕托運

**使用、持有或運輸毒品均會觸犯法律，最重可處死刑。**

- 毒品的**製造、販賣、非法使人施用或引誘人施用、轉讓**均觸犯法律且刑責相當嚴重
- 身上被查獲有藥丸，雖然尿液檢驗未發現，仍可能會因為「持有」或「意圖販賣持有」而判刑
- 使用毒品者自動向**合格醫療機構**請求專業治療，可減免其法律責任。

# 行動三 Stop 拒絕



- 拒交損友

網路交友或複雜環境認識的朋友及其介紹的朋友，交往要小心。




資料來源  
華視新聞  
2020/01/03

# 行動三 Stop 拒絕



## • 拒交損友



# 行動四 Help 助人



## 主動注意

### 染毒四徵兆

請 **關心** 您的家人

請主動關心家人的日常生活與交友狀況，若有異常，  
可撥打 **0800-770-885** (請請您 幫幫我)，向各縣市毒品危害防制中心尋求協助。

#### 作息改變

精神異常亢奮、持續不睡、徹夜不歸、或一睡就是2、3天



#### 行為異常

逃課、逃家、結黨、經常上廁所，莫名摔東西



#### 情緒不穩

脾氣暴躁、喜怒無常、躁動不安、沮喪、多疑



#### 特殊物品

可疑白色粉末、特殊吸食器、奇特香菸製品



# 行動四 Help 助人



- 主動注意

吸毒者常出現作息混亂、精神恍惚、身上或房間有特殊氣味、金錢花費變大、偷竊說謊、暴躁易怒、注意力降低、食慾差或消瘦、攜帶吸毒相關器具等狀況。



圖片來源  
自由時報  
2015/08/15

# 行動四 Help 助人



- 適時關懷

發現親友、同事有接觸毒品的徵兆，適時關懷並尋求專業人員協助(撥打專線)。

有  一定成功

24小時 不打烊之免費戒毒成功專線

0800-770-885

(請請你·幫幫我)



法務部



戒毒成功專線

<http://refrain.moj.gov.tw>

# 行動四 Help 助人



- 支持陪伴戒毒的人

1. 成癮是慢性腦部疾病，接納努力戒毒的人，支持他回歸社會是脫離毒癮的重要關鍵。



圖片來源  
自由時報  
2020/03/22

台灣基督教主愛之家關懷中心，昨天舉行「人生逆轉勝 創意生活木工班」開訓典禮，協助更生人習得木工技巧。（主愛之家提供）



# 行動四 Help 助人



- 支持陪伴戒毒的人

## 名人案例

美國知名影星小勞勃道尼曾因毒品及酒精濫用而入獄並接受勒戒，演藝事業停擺。戒毒成功後，小勞勃道尼離開那段吸毒迷途，重振事業，演出《鋼鐵人》等多部叫好又叫座的電影，創下演藝事業高峰，也擁有幸福家庭。





# 防毒防身

## 五錦囊

拒絕染毒上身



上上籤

是非場所要遠離

上上籤

反毒觀念要落實

上上籤

健康休閒要培養

上上籤

抗壓自信要建立

上上籤

親子關係要培養

# 感謝有您!

衛生福利部食品藥物管理署  
臺灣健康促進學校協會製作

# 補充資料



## 認識毒品作用

毒品依其對人體的作用，可分為

- 中樞神經抑制劑（如鴉片類、K他命）
- 中樞神經興奮劑（如安非他命、搖頭丸）
- 迷幻劑（如大麻、強力膠、LSD）。

### 常見濫用藥物分級

第一級	第二級	第三級	第四級
1. 海洛因 2. 嗎啡 3. 鴉片 4. 古柯鹼	1. 安非他命 2. MDMA (搖頭丸) 3. 大麻 4. LSD (搖腳丸、一粒沙) 5. Psilocybine (西洛西賓)	1. FM2 2. 小白板 3. 丁基原啡因 4. Ketamine (愷他命) 5. Nimetazepam (一粒眠、K5、紅豆)	1. Alprazolam (蝴蝶片) 2. Diazepam (安定、煩寧) 3. Lorazepam 4. Tramadol (特拉嗎竇)

# 中樞神經抑制劑



濫用藥物 / 俗名	分級	醫療用途	濫用方式	濫用危害
<b>伽瑪羥基丁酸 GHB</b> 液態搖頭丸 Liquid Ecstasy Georgia Home Boy G	II	無	口服	噁心、嘔吐、呼吸困難、失去意識、昏迷及死亡，與酒精併用會加劇其危險性。  <b>戒斷症狀</b>  失眠、焦慮、顫抖及流汗。
<b>丙泊酚 Propofol</b> 牛奶針	IV	全身麻醉之誘導及維持	靜脈注射	心跳減緩、呼吸抑制。



濫用藥物 / 俗名

分級

醫療用途

濫用方式

濫用危害

鴉片  
Opium

福壽膏  
芙蓉膏



I

鎮痛  
止瀉

經口  
吸食

1.嗜睡、噁心、嘔吐、呼吸抑制、便秘、尿滯留、瞳孔縮小。

嗎啡  
Morphine

魔啡



I

鎮痛

注射  
口服

2.海洛因主要濫用方式為靜脈注射，常因針頭不潔造成感染，共用針具(含針頭、針筒及稀釋液)更可造成愛滋病、病毒性肝炎、梅毒等血液傳染疾病。

海洛因  
Heroin

白粉  
四號  
細仔



I

無

注射  
吸食

3.具有極強生理及心理成癮性。

戒斷症狀

打呵欠、盜汗、流眼淚、流鼻水、皮膚起疙瘩、失眠、焦慮不安、易怒、發冷、嘔吐、腹痛、肌肉及骨骼疼痛。

口服



濫用藥物 / 俗名	分級	醫療用途	濫用方式	濫用危害
<b>氟硝西泮</b> <b>Flunitrazepam</b> 十字架 FM2 	III	鎮靜 安眠	口服 注射	1.嗜睡、精神恍惚、運動失調、頭痛、噁心、健忘、注意力不集中、意識不清。  2.具藥物依賴性。  <div style="text-align: center; border: 2px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">戒斷症狀</div> 焦慮、失眠、憂鬱、顫抖、暈眩、妄想、痙攣。
<b>硝甲西泮</b> <b>Nimetazepam</b> 一粒眠 紅豆 	III	鎮靜 安眠	口服	
<b>三唑他</b> <b>Triazolam</b> 小白板 	III	鎮靜 安眠	口服	



# 中樞神經興奮劑



濫用藥物 / 俗名

分級

醫療用途

濫用方式

濫用危害

古柯鹼  
**Cocaine**

可卡因  
快克  
crack  
snow



I  
局部麻醉  
止流鼻血

鼻吸  
煙吸  
注射

興奮、瞳孔放大、失眠、躁動、焦慮不安、食慾不振、噁心、嘔吐、妄想型精神病、心律不整、痙攣。

**戒斷症狀**

呆滯、疲勞、焦慮、煩躁不安、憂鬱。

安非他命  
Amphetamine  
甲基安非他命  
Methamphetamine

II

無

口服  
鼻吸  
煙吸  
注射

冰塊  
冰糖  
鹽  
安公子  
安仔  
炮仔



1.精神方面不良作用：  
失眠、焦慮、暴躁易怒、情緒不穩、記憶減退、妄想、視幻覺、聽幻覺、譫妄、具攻擊性、自殺及殺人傾向、精神分裂症(思覺失調症)、神經系統傷害等。

2.心臟血管不良作用：  
心跳加速、心悸、心律不整、高血壓、腦溢血。

3.過量時：會造成昏迷、體溫過高、橫紋肌溶解及急性腎衰竭，甚至會導致死亡。

亞甲基雙氧  
甲基安非他命  
Methylenedioxy-  
methamphetamine

II

無

口服

搖頭丸  
狂喜  
忘我  
綠蝴蝶  
MDMA



戒斷症狀

沮喪、憂鬱、全身乏力、焦慮易怒。





# 中樞神經迷幻劑



濫用藥物 / 俗名	分級	醫療用途	濫用方式	濫用危害
<b>大麻</b> <b>Cannabis</b> <b>Marijuana</b> <b>Hemp</b> 草 麻仔 老鼠尾	II	無	口服 煙吸	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 吸食後會產生心跳加速、妄想、幻覺、口乾、眼睛發紅等現象，長期使用會造成記憶、學習及認知能力減退、體重增加、免疫力降低、呼吸道疾病、動機缺乏症候群。</li><li>2. 青少年使用會造成智力商數下降，記憶及學習能力降低。</li><li>3. 孕婦使用會造成胎兒腦部發育異常。</li></ol> <p><b>戒斷症狀</b></p> <p>易怒不安、躁動、食慾減退、失眠。</p>



濫用藥物 / 俗名	分級	醫療用途	濫用方式	濫用危害
<b>麥角二乙胺</b> <b>Lysergic acid diethylamide (LSD)</b> 搖腳丸 ELISA 加州陽光 白色閃光 Acid	II	無	口服 舌下	瞳孔放大、體溫升高、心跳及血壓上升、思考及感覺扭曲、妄想、肌肉僵直及發抖，過量可造成精神疾病甚至死亡。
				
<b>苯環利定</b> <b>Phencyclidine (PCP)</b> 天使塵	II	無	口服 煙吸 鼻吸 注射	幻覺、妄想、感覺扭曲、步態不穩、眼球震顫、失憶、言語及思考障礙、憂鬱、暴力及自殘行為，昏迷甚至死亡。
				
<b>西洛西賓</b> <b>Psilocybine</b> 迷幻蘑菇	II	無	口服	幻覺、無法區分現實和幻覺、恐慌、肌肉無力、瞳孔放大、噁心、嘔吐、嗜睡。
				



# 吸入性濫用物質



濫用藥物 / 俗名	分級	醫療用途	濫用方式	濫用危害
<b>有機溶劑</b> <b>Organic solvent</b> 強力膠 打火機油 修正液 油漆 汽油	未列	無	吸入	意識不清、口齒不清、運動失調、頭痛、幻覺、妄想、心律不整、猝死、長期濫用導致認知障礙、腎功能衰竭或肝毒性。
<b>一氧化二氮</b> <b>N<sub>2</sub>O</b> 笑氣 吸氣球	未列	手術 麻醉	鼻吸	精神異常、嗜睡、抑鬱、末梢神經及骨髓病變、貧血、手腳麻痺。



# 新興影響精神物質



濫用藥物 / 俗名	分級	醫療用途	濫用方式	濫用危害
<b>類大麻活性物質</b> <b>Synthetic cannabinoids</b> K2 Spice	II-III	無	煙吸 口服	心跳加速、嘔吐、激動、混亂、幻覺、焦慮、妄想、增加心臟病風險，具成癮性，相較於天然大麻，危害更嚴重。
				<b>戒斷症狀</b> 頭痛、焦慮、憂鬱、易怒。



濫用藥物 / 俗名

分級 醫療用途 濫用方式

濫用危害

愷他命  
**Ketamine**

卡門  
K他命  
Special K  
K仔  
Cat valium

III

手術  
麻醉

口服  
鼻吸  
煙吸  
注射

心搏過速、血壓上升、噁心、嘔吐、流淚、複視、視力模糊、影像扭曲、頭暈、暫時性失憶症、無法行走，高劑量可造成呼吸抑制致死。專注力、學習及記憶力受損、幻覺，長期濫用影響膀胱功能、膀胱炎、頻尿、尿量減少、下腹部疼痛、血尿、甚至腎功能不全。



## 合成卡西酮類物質 Synthetic cathinones

3,4-亞甲基雙氧  
焦二異丁基酮  
3,4-methylenedioxy-  
pyrovalerone  
MDPV



II 無 吸食  
口服

1.心跳加速、血壓上升、體溫上升、妄想、幻覺、攻擊性、暴力行為、自殘。

2.具成癮性。

3.長期使用產生精神錯亂、骨骼肌組織分解、腎衰竭、甚至致死。

4-甲基甲基卡西酮 III 無 口服

喵喵  
Meow Meow  
m-Cat



### 戒斷症狀

憂鬱、焦慮、睡眠障礙、發抖、妄想。

3,4-亞甲基雙氧  
甲基卡西酮  
3,4-methylenedioxymeth-  
cathinone、  
Methylone  
bk-MDMA



III 無 口服

合成卡西酮類物質，俗稱為浴鹽(Bath salts)，常見成分為 MDPV、Mephedrone、Methylone 等。



# 補充資料



## 沒有放水

**修法對於毒品縱容、放水?-----完全曲解!!**

為了重懲及遏止新興毒品的散播，修法除了提高對毒販的刑度以外，也將持有三級、四級毒品之處罰範圍，**由20公克改為5公克以上，差了4倍。**

由於持有一級毒品刑期是三年以下，所以持有三級毒品才定為二年以下，符合罪與刑相當原則，這絕不是對毒品的縱容、放水。


**對症下藥，不是輕縱。遠離毒品，才是正辦！**

# 修法要點



MINISTRY OF JUSTICE

## 縮短新興毒品列管時程



資料來源毒品大本營



# 修法要點




MINISTRY OF JUSTICE

## 重罪重懲、遏止新興毒品的散播

新興  
毒品

持有第三級、第四級毒品由20公克降為5公克以上，即懲以刑罰，擴大4倍入刑範圍。



刑度

- 重懲毒販，提高製造、販賣、運輸毒品之刑度及罰金。
- 加重販賣混合式毒品及對懷孕、未成年人販毒之刑度。
- 擴大沒收、澈底剝奪毒販不法所得。

# 修法要點



MINISTRY OF JUSTICE

## 扣案毒品物可於判決確定前銷燬

現行法  
判決確定**後**  
始得銷燬

■缺點→

訴訟過程中，保管毒品須耗費大量人力、物力，且易生危險及毀損之風險

修法後  
判決確定**前**  
得銷燬

■要件→

對於易生危險、有損失毀損之虞、不便保管或保管費用過鉅之毒品先行取樣後，得先銷燬